

ঘৰটীয়া জন্তুৰ পেলু নিবাৰণ কৰো আহক

পেলু নিবাৰণ

গৰু, ম'হ, ছাগলী, গাহৰি, হাঁহ-কুকুৰা আদিৰ স্বাস্থ্যজনিত এক অন্যতম সমস্যা হ'ল পেলু বা কৃমি। ই তিনি প্ৰকাৰৰ - ঘূৰণীয়া, ফিটা আৰু চেপেটা। এই তিনি প্ৰকাৰৰ পেলুৱেই পশুধনৰ উৎপাদন বৃদ্ধিত আৰু স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত এক অপূৰণীয় ক্ষতি কৰি আহিছে। সেয়েহে আজিৰ পশুপালকসকল এই বিষয়ে সজাগ হোৱা অতি প্ৰয়োজনীয়।

পেলু নিবাৰণৰ প্ৰয়োজনীয়তা :

এই তিনি প্ৰকাৰৰ পেলু দেহৰ আভ্যন্তৰীণ বিভিন্ন অংগত পোৱা যায়। যেনে - ক্ষুদ্ৰান্ত, বৃহদন্ত, পাকস্থলী, যকৃৎ, হাওঁফাওঁ, কলিজা ইত্যাদি। পেলুৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত পশুধনৰ উৎপাদন ক্ষমতা কমি যায় আৰু স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটে। গৰু-ছাগলী শুকাই-খীনাই হাড়ে ছালে লাগি যায়, শৌচ টিলা হয়, হজম শক্তি কমি যায় আৰু অৱশেষত মৃত্যুমুখতো পৰিব পাৰে। এই পেলুৰ কণী শৌচৰ লগত ওলাই গৈ অন্যান্য সুস্থ জীৱ-জন্তুকো আক্ৰান্ত কৰিব পাৰে।

পেলু নিবাৰণ সময় :

আজিকালি পেলু নিবাৰণৰ বিভিন্ন দৰৰ পোৱা যায়, যিবোৰ ব্যৱহাৰ কৰা অতি আৱশ্যক। এনে দৰৰ ব্যৱহাৰৰ উপযুক্ত সময় হ'ল -

- (ক) গৰু-ম'হ - বছৰত দুবাৰ। বাৰিষা আৰম্ভ হোৱাৰ ঠিক আগে আগে এবাৰ আৰু বাৰিষা শেষ হোৱাৰ পাছত এবাৰ। নতুনকৈ জন্ম হোৱা গৰু পোৱালিক ডেৰমাহ বয়সত পাইপেৰাজিন আৰু তিনিমাহৰ পাছত থিয়াবেনদাজ'ল খুৱাব লাগে।
- (খ) ছাগলী - ছাগলী পোৱালীক ১ মাহৰ পাছত এই দৰৰ খুৱাব লাগে। প্ৰথম অৱস্থাত প্ৰতি মাহৰ মুৰে মুৰে আৰু ডাঙৰ হৈ অহাৰ লগে লগে প্ৰতি ৪-৬ মাহৰ মুৰত খুৱাব লাগে।
- (গ) গাহৰি - গাভিনী গাহৰিক পোৱালি দিয়াৰ তিনি সপ্তাহৰ আগত আৰু অন্যান্য গাহৰিত প্ৰতি ৪ মাহৰ মুৰে মুৰে খুৱাব লাগে।
- (ঘ) হাঁহ-কুকুৰা - কুকুৰা পোৱালিক এই দৰৰ দিয়া নহয়। ২ মাহ মান বয়সৰ পৰাহে প্ৰতি মাহে দৰৰ খুৱাব লাগে।

ল'ব লগা সাৱধানতা :

- (ক) দৰৰ সদায় পশু চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শমতে উপযুক্ত পৰিমাণতহে দিব লাগে।
- (খ) দানা বা পানীৰ লগত দৰৰ মিহলাই খুওৱাব পাৰি।
- (গ) সদায় পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা বজাই ৰাখিব লাগে।
- (ঘ) গোৱৰ সদায় গোহালিৰ পৰা আঁতৰত পেলাব লাগে।
- (ঙ) পেলুৰ দৰৰ খুওৱাৰ আগে আগে ১০ ৰ পৰা ১২ ঘণ্টামান সময় (বয়সৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি) খালী পেটে ৰাখিব লাগে।

(উৎস : পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গুৱাহাটী - ২২)