

অধিক উৎপাদনৰ বাবে গাভিনী গৰুজনীৰ যতন লওঁ আহক

কৃত্ৰিম প্ৰজনন কৰাৰ পিছত গৰুজনী দুমাহলৈকে গৰম নহ'লে ওচৰৰ পশু চিকিৎসকৰ দ্বাৰা পৰীক্ষা কৰাই গাভিনী হৈছে নে নাই খাটাংকৈ নিৰ্দ্ধাৰণ কৰি ল'ব লাগে। চাৰি মাহ অতিক্ৰম কৰাৰ পিছত গৰুজনীয়ে চেহেৰাৰ পৰিৱৰ্তন দেখুৱায়। চেউৰী হ'লে লাহে লাহে ওহাৰ বাঢ়িব ধৰে। অৱশ্যে গাইগৰুৰ পোৱালি দিয়াৰ দহ-পোন্ধৰ দিন মানৰ আগতহে ওহাৰ নামিব ধৰে। এই সময়ত গৰুজনীক সুস্বাদু খাদ্য, প্ৰচুৰ নিৰ্মল পানী আৰু বিশ্ৰামৰ দৰকাৰ কিয়নো এই সময়ত নিজৰ শৰীৰ ৰক্ষাৰ বাহিৰেও বাঢ়ি অহা পোৱালিটোৰ বাবে শৰীৰক আহাৰ যোগাব লাগে। এইটো সময়ত এজনী গাইগৰুৱে দিনটোত ত্ৰিশ /চল্লিশ কিলোগ্ৰাম কেঁচা ঘাঁহ আৰু পাঁচ /ছয় কিলোগ্ৰাম সুস্বাদু দানা আৰু অন্যান্য ভিটামিন আৰু ধাতৱ লোন পাব লাগে।

তাৰোপৰি গাইজনীক মূল জাকৰ পৰা আঁতৰাই অলপ পৃথক কৈ ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। এই সময়ত আন আন খাদ্য দ্ৰব্যৰ লগতে ধাতৱ কেলচিয়াম খাদ্যও যোগান ধৰিব লাগে। নহ'লে গাইজনীয়ে অভাৱজনীত ৰোগত ভুগিব পাৰে যাৰ ফলত পিছত ঠেং দুখন জঠৰ হৈ তৎ নোহোৱা হয়। গৰ্ভৱস্থাৰ সময়ত হোৱা প্ৰধান ৰোগ হ'ল গৰ্ভপাত। গৰ্ভপাত হোৱাৰ কিবা লক্ষণ দেখিলে যেনে পেটত বিষ অনুভৱ হোৱা, যোনি পথেৰে বিজল আদি ওলোৱা, তৎক্ষণাত চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে।

(উৎস : পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়, অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গুৱাহাটী - ২২)